



ADMINISTRAȚIA DE STAT A AVIAȚIEI CIVILE
A REPUBLICII MOLDOVA

DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ

DO – 01/2000

Cu privire la prevenirea infectării cu boli deosebit de periculoase ale membrilor echipajelor de zbor

1. Prezenta Directivă Operațională este emisă întru executarea Anexei nr. 9 la Convenția privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944) și a documentelor Organizației Mondiale a Sănătății, în conformitate cu prevederile Legii aviației civile a Republicii Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1057, precum și prevederilor Reglementării aeronautice civile RAC-11.

2. Prezenta Directivă Operațională stabilește obligațiuni și cerințe pentru operatorii aerieni cu scopul de a preveni infectarea cu infecții deosebit de periculoase și alte infecții a membrilor echipajelor de zbor, precum și de a preveni introducerea infecțiilor respective pe teritoriul Republicii Moldova.

3. Operațiunile aeriene, precum și orice alte activități aflate sub incidența prezentei Directive pot fi executate numai în concordanță cu prevederile acesteia.

4. Conducătorii întreprinderilor din aviația civilă vor dispune însușirea și aplicarea prezentei Directive.

Prim-vicedirector general



Vladimir Petras

DO 001 Prevederi generale

Prezenta Directivă Operațională stabilește cerințe obligatorii pentru operatorii aerieni din Republica Moldova referitoare la profilaxia bolilor infecțioase la membrii echipajelor de zbor în legătură cu activitățile de operare a aeronavelor în regiunile în care sînt răspîndite boli infecțioase deosebit de periculoase.

DO 002 Scopul

Prezenta Directivă are drept scop asigurarea prevenirii și tratării bolilor infecțioase la membrii echipajelor de zbor care execută operațiuni de zbor în țările menționate la DO 001.

DO 003 Premisele emiterii Directivei

Prezenta Directivă este emisă în legătură cu:

- efectuarea operațiunilor aeriene în țările nefavorabile din punct de vedere al infecțiilor de carantină (ciumă, holeră, febră galbenă), precum și al altor boli infecțioase; și
- afecțiunea sporită a cazurilor de malarie printre membrii echipajelor de zbor aflați în deplasare în țările Africii Centrale și de Sud, inclusiv cazuri de deces, precum și cu cazurile frecvente de introducere a malariei în Republica Moldova.

DO 004 Cerințe privind profilaxia și tratarea bolilor infecțioase

(1) Conducătorii întreprinderilor din aviația civilă trebuie să asigure:

- a) existența în trusele de prim ajutor aflate la bordul aeronavelor și la fiecare membru al echipajului care pleacă sau care deja activează în țările endemice de malarie (Africa Centrală și de Sud, Orientul Apropiat, Asia de Sud-Est, America Centrală și de Sud) a preparatului pentru tratarea malariei **"Mefloguine (Lariam)"**. Este necesar ca pentru fiecare membru al echipajului să se asigure minimum 4 comprimate a cîte 250 mg, iar în trusa de prim ajutor să existe suplimentar 4 ambalaje a cîte 8 comprimate;
- b) existența la bordul aeronavelor ce au zburat în regiunile enumerate mai sus a insecticidelor, repellenților și fumiganților electrici;
- c) organizarea instruirii membrilor echipajelor de zbor asupra metodelor de dezinsectie ale aeronavelor și obligarea acestora să efectueze, sub responsabilitatea comandanțului de aeronavă, prelucrarea aeronavele înainte de sosirea pe unul dintre aerodromurile de bază din regiunile enumerate mai sus în scopul prevenirii introducerii insectelor și transportarea acestora către punctul de destinație (pentru informații suplimentare adresați-vă șefului secției igienă aeronautică și punctului control sanitar al aeroportului „Chișinău”, tel.: 52-44-60);
- d) organizarea instruirii angajaților asupra măsurilor de protecție și profilaxie a infecțiilor deosebit de periculoase și normelor sanitare de igienă personală;



- e) vaccinarea sau revaccinarea obligatorie a tuturor angajaților contra febra galbenă (valabilitatea vaccinei – de la 10 zile pînă la 10 ani) care pleacă în țările nefavorabile din punct de vedere a febrei galbene și fiecare angajat să dețină un certificat internațional ce confirmă vaccinarea.

Vaccinările recomandate și termenele lor de valabilitate:

- Holeră (de la 7 zile pînă la 6 luni după vaccinare);
- Tifos (de la 7 zile pînă la 3 ani după vaccinare);
- Poliomielită (după 3 vaccinări - 10 ani);
- Tetanos (după 3 vaccinări - 10 ani).

- f) prezentarea Serviciului Medicină Aeronautică al Administrației de Stat a Aviației Civile a informației care să cuprindă lista membrilor de echipaje care pleacă în deplasare în regiunile sus-menționate și care sosesc din aceste regiuni, țările și perioada de aflare, cu 7 zile înainte de plecare și cu 3 zile pînă la sosire;
- g) ca toți angajații, la sosirea din regiunile nefavorabile, să fie supuși, în mod obligatoriu, unui examen medical pe parcursul primelor 3 zile și să prezinte medicului întreprinderii sau expertului de medicină aeronautică rezultatele examinării;
- h) familiarizarea tuturor angajaților care deja își desfășoară activitatea sau care vor pleca în regiunile respective cu informația indicată la DO 004 (2), (3) și (4).

(2) Fiecare membru al echipajului care se află sau care sosește din țările endemice de malarie trebuie să țină cont de faptul că atunci când simt un oarecare disconfort, fac febră, au frisoane și nu există posibilitatea de a solicita asistență medicală urgentă sau să facă investigații de laborator este necesar să aprecieze simptoamele respective ca manifestare a malariei tropicale și să administreze doza medicală de "**Mefloquine (Lariam)**", ceea ce constituie 15 mg pentru 1 kg de greutate (dar să nu depășească 1 g sau 4 comprimate), împărțind în 2 administrațri timp de 1 zi. Este necesar să se cunoască că în legătură cu efectul secundar posibil al preparatului respectiv, după administrarea numai unei comprimate, personalul aeronautic trebuie înlăturat de la zboruri pentru o perioadă de 2 săptămâni. Personalul la sol poate administra "**Mefloquine (Lariam)**" în calitate de măsură de profilaxie - 250 mg (1 comprimată) o dată pe săptămînă, dar nu mai mult de 3 luni în legătură cu efectele secundare pe care le are. Este necesar ca persoanele afectate, după sosire, să fie internate în spital și expertul medical aeronautic să fie anunțat despre aceasta. Măsura corespunzătoare este necesară să fie respectată pentru prevenirea cazurilor mortale care în cazul malariei tropicale sunt posibile într-un termen foarte scurt (în primele 1-3 zile).

(3) Înîнд cont de faptul că contra multor boli extrem de periculoase nu există vaccine, este necesar să se respecte anumite reguli generale, și anume:

(a) regulile de alimentare:

- alimentarea este permisă în locurile unde sunt utilizate produse industriale, calitatea cărora este garantată;



- este interzis de a consuma produse de bucătărie națională tradițională, produse cu termenul de valabilitate expirat, produse care n-au fost supuse unui tratament tehnologic, precum și produse procurate în stradă;
- pentru alimentare să se utilizeze numai apă fiartă sau industrial ambalată, băuturi și sucuri industriale și de o calitate garantată;
- este interzis de a procura gheăță pentru răcirea băuturilor de la vînzătorii din stradă;
- este necesar de a consuma numai acele fructe sau legume care pot fi curățate sau supuse tratării termice (pentru spălat va fi utilizată numai apă fiartă sau industrial ambalată).

(b) organizarea odihnei:

- scăldatul este permis numai în bazine sau rezervoare de apă speciale;
- este interzisă bronzarea fără așternut și mersul desculț.

(c) regulile de cazare:

- cazarea este permisă numai în încăperile dotate cu alimentare centralizată cu apă și canalizare;
- pentru prevenirea insolației și şocului termic este necesar de a purta îmbrăcăminte uşoară și din ţesătură naturală, pălărie și ochelari de soare (protecție), de a aplica cremă contra bronzării pe sectoarele deschise ale pieii, iar seara – repellenți contra întepăturilor de țânțar;
- este necesar de a mări cantitatea de lichid consumat, de a limita consumul de băuturi alcoolice;
- este necesar de a fi precauți în contactul cu animalele, deoarece acestea pot fi transmițători ai multor boli infecțioase și parazitare, nu se recomandă de a atinge pisici și cini practic în toate țările tropicale. În cazul în care animalul v-a mușcat, zgâriat sau lins este necesar de a spăla cu apă această porțiune a corpului și de a consulta medicul în vederea soluționării chestiunii privind vaccinarea contra turbării și tetanosului.

(4) În cazurile în care toate măsurile de profilaxie au fost asigurate și respectate, dar v-ați îmbolnăvit, este necesar de a cunoaște toate simptoamele primare ale infecțiilor deosebit de periculoase, atunci cînd în cazul lipsei asistenței medicale de urgență probabilitatea de deces este mare:

- în caz de holeră – diaree și vomitare;
- în caz de ciumă – temperatură înaltă, frisoane puternice, dureri de cap, mărire nodurilor limfatice, tuse cu sînge;
- în caz de febră hemoragică virotică deosebit de periculoasă (Ebol, Lass, Marburg) – temperatură înaltă, dureri de cap, astenie, dureri a cutiei toracice și de stomac, erupție hemoragică, rinoragie, hemoragie a gingiilor, scaun cu sînge și sînge în masele vomitive;



- în caz de febră galbenă – temperatură înaltă, erupție hemoragică, apariția icterului;
- SIDA: calea principală de infectare – filiera genitală, atunci când au loc contacte sexuale accidentale, precum și parenterală – atunci când pentru acordarea asistenței medicale sunt utilizate instrumente murdărite de sânge, în special cele stomatologice (este necesar de a vizita stomatologul înainte de plecare în regiunile menționate mai sus). Simptoamele caracteristice de manifestare sunt slăbirea bruscă, diareea cronică, mărirea nodurilor limfatice, tuse persistentă, leziune micotică.

DO 005 Sancțiuni

În cazul nerespectării de către operatorii aerieni a prevederilor prezentei Directive, operarea aeronavelor acestora în regiunile care fac obiectul prezentei Directive va fi interzisă iar toate materialele vor fi prezentate organelor competente din Republica Moldova pentru investigare.

DO 006 Responsabilitatea conducătorilor întreprinderilor

Conducătorii întreprinderilor din aviația civilă care operează aeronave în regiunile în care sunt răspândite boli infecțioase deosebit de periculoase sunt responsabili de aplicarea și executarea prezentei Directive.

